

# Kønsforskelle ved alkoholrelateret demens

## Mænd og kvinder har muligvis forskellig modstandskraft i forhold skadevirkningerne af alkoholmisbrug.

Misbrug af alkohol er væsentligt mere udbredt blandt mænd end blandt kvinder, og de fleste undersøgelser af alkoholmisbrugere rummer således overvejende mandlige deltagere.

Men undersøgelser af kvinder, der misbruger alkohol, viser en tendens i retning af, at de har relativt lettere ved at udvikle en alkoholbetinget hjerneskade.

Hypotesen om kønsforskelle i sårbarheden over for alkohol er bl.a. baseret på, at selv om kvindelige alkoholmisbrugere typisk har et lavere alkoholforbrug og en kortere drikkehistorie end mandlige alkoholmisbrugere, udvikler de alligevel hjernesvind i hurtigere tempo end mændene.

Der er også tendens til, at den kognitive forringelse er mere udtalt hos kvindelige misbrugere, og at relativt flere kvindelige end mandlige misbrugere udvikler alkoholrelateret demens eller Wernicke-Korsakoffs syndrom.

Ceylan-Isik AF, McBride SM, Ren J. Sex difference in alcoholism: who is at a greater risk for development of alcoholic complication? *Life Sci.* 2010;87(5-6):133-8

[PubMed](#)

Senest opdateret: 13. august 2020