

## Supplerende undersøgelser

Hvis den basale undersøgelse ikke giver tilstrækkelig diagnostisk afklaring, kan udredningen suppleres med en eller flere specialundersøgelser.

Udvalget af supplerende undersøgelser, og muligheden for at henvise til en af disse, varierer afhængigt af lokale forhold.

**Læs mere om supplerende undersøgelser:**

[Neuropsykologisk undersøgelse](#)

[EEG](#)

[Undersøgelse af rygmarvsvæsken](#)

[Genetisk udredning og rådgivning](#)

[Funktionel scanning](#)

[Amyloid-scanning](#)

[Strukturel scanning](#)

[Gå til Faglige redskaber til udredning af demens](#)

National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens. København: Sundhedsstyrelsen; 2018. Anbefalingerne er ikke længere gældende.

[Sundhedsstyrelsen](#)

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens. København: Sundhedsstyrelsen; 2013. Anbefalingerne er ikke længere gældende.

[Sundhedsstyrelsen](#)

Hasselbalch SG. State of the art-udredning af demens. Ugeskrift for Læger. 2017;179(12)

[PubMed](#)

Senest opdateret: 18. august 2020