

ARTIKEL

Kognitiv vurdering

En demensdiagnose forudsætter, at der kan påvises kognitiv svækkelse. En systematisk vurdering eller 'måling' af det kognitive funktionsniveau udgør således...

ARTIKEL

Basisundersøgelser

En demensdiagnose stilles på baggrund af en række forskellige undersøgelser og tests.

ARTIKEL

Tilbage melding

Ved udredningsforløbets afslutning bør patient og pårørende tilbydes en informationssamtale, hvor de får oplysninger om undersøgelsesresultater, diagnose og behandlingsmuligheder.

ARTIKEL

Objektiv undersøgelse

Den objektive undersøgelse foretages af en læge og indeholder normalt en vurdering af bevidsthedsniveauet, en almen somatisk undersøgelse, en kort...

ARTIKEL

Sygehistorie

Det vigtigste element i udredning af demens er en udførlig og systematisk sygehistorie (anamnese). Anamnesen kan med fordel optages med...

ARTIKEL

Udredningsforløbet

Udredning af demens organiseres forskelligt, og det er derfor vanskeligt at beskrive et typisk forløb. Overordnet kan de fleste forløb...

ARTIKEL

Diagnose for alkoholrelateret demens

The American Psychiatric Associations klassifikationssystem DSM-5 indeholder diagnosen neurokognitiv lidelse forårsaget af alkohol-, stof- eller medicinbrug, hvorunder demens forårsaget af...

ARTIKEL

Udredning af demens ved Downs syndrom

Kromosom 21 rummer flere gener, som man mener spiller en rolle i forbindelse med Alzheimers sygdom.

ARTIKEL

Udredning og behandling af atypiske Parkinsonsygdomme

ARTIKEL

Udredning af demens ved Parkinsons sygdom

Diagnosticering af atypiske parkinsonsyndromer er en forholdsvis vanskelig opgave, der bedst varetages af specialister i bevægeforstyrrelser og demens.

Ved diagnosticering af demens ved Parkinsons sygdom anbefales det at anvende det sæt af diagnoskriterier, som en ekspertgruppe under the...